

**Annexe 1<sup>re</sup>: grille de référence relative à certains types de cancers pour lesquels le délai est réduit  
(art. 61/3, § 1<sup>er</sup>)**

Types de pathologies	Types histologiques et stades de référence - stades pré-thérapeutiques	Délai d'accès à compter de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse et sans rechute
Cancers du testicule	Séminomes purs, stade I Séminomes purs, stade II  Tumeurs non-séminomateuses ou mixtes, Stade I et II	3 ans 6 ans  6 ans
Cancers du sein	Carcinome lobulaire ou canalaire <i>in situ</i> strict sans caractère micro-infiltrant Traitement selon le consensus HAS/INCa réalisé  Carcinome canalaire <i>in situ</i> présentant lors de l'exérèse chirurgicale une ou plusieurs zones de micro-invasion (rupture de la membrane basale) n'excédant pas 1 mm (dans le plus grand axe) et dont l'exploration axillaire (ganglion sentinelle ou curage axillaire) ne montre pas d'envahissement du ou des ganglions prélevés Traitement selon le consensus HAS/INCa réalisé	1 an

Annexe 1 <sup>re</sup> : grille de référence relative à certains types de cancers pour lesquels le délai est réduit (art. 61/3, § 1 <sup>er</sup> )		
Types de pathologies	Types histologiques et stades de référence - stades pré-thérapeutiques	Délai d'accès à compter de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse et sans rechute
Mélanome de la peau	Mélanome <i>in situ</i> pur sans caractère micro-infiltrant ou de niveau I de Clark - Exérèse complète - Absence de syndrome des nævi dysplasiques	1 an
Cancer du col de l'utérus	Classe CIN III (ou HSIL) ou <i>in situ</i> pur sans caractère micro-infiltrant Application d'un traitement de référence en vigueur au moment de la prise en charge et une surveillance selon recommandations HAS	1 an
Cancers du rein	- Carcinome du rein à cellules claires diagnostiqué après l'âge de 50 ans, classé T1N0M0 grade de Führman 1 et 2	8 ans
	- Carcinome du rein à cellules chromophobes, classé T1N0M0	5 ans
Cancers du côlon et du rectum	Stade Tis (stade 0) : - Plus de 50 ans au diagnostic	1 an
	Stade I : T1N0M0 : - Plus de 50 ans au diagnostic - Type histologique : adénocarcinome	4 ans
	Stade I : T2N0M0 : - Plus de 50 ans au diagnostic - Type histologique : adénocarcinome	8 ans
Cancers de la thyroïde	Papillaire/vésiculaire, < 45 ans au diagnostic, stade I	3 ans
	Papillaire/vésiculaire, 45 ans ou plus au diagnostic, stade I ou II	3 ans
	Papillaire/vésiculaire, 45 ans ou plus au diagnostic, stade III	6 ans
Lymphomes hodgkiniens	Lymphomes hodgkiniens classés stade 1A après une période de suivi post-thérapeutique	6 ans
	Lymphomes hodgkiniens classés stades 1B et 2A après une période de suivi post-thérapeutique	8 ans
Leucémie aigue promyélocytaire/LAP/LAM3	- Quel que soit le nombre de leucocytes au diagnostic - Traitement réalisé	3 ans

Il est rappelé ici que les conditions d'accès à une assurance solde restant dû sur la base des délais mentionnés ci-dessus sont conditionnées à l'absence d'autres facteurs de risques ou pathologies existantes.